



SUBSTRAL CELAFLORE® CAREO ZUM GIEßEN

- **Packung:** 100 ml
- **Artikelnummer:** 66770
- **EAN:** 4062700866771
- **UN Nummer:** 3082

GHS09



KEYWORDS:

Schädlingsbekämpfung;Zierpflanzen;Bürräume;Gewächshaus;Wintergarten;Kübelpflanzen;Balkonpflanzen

HIGHLIGHTS:

Unkomplizierte Anwendung: einfach & schnell mit Wasser verdünnt über die Erde gießen;Für Zimmer-, Balkon- & Terrassenpflanzen;Gegen saugende und beißende Schädlinge an Zierpflanzen wie Blattläuse, Weiße Fliege, Schild-, Woll- und Schmierläuse sowie Dickmaulrüssler;Systemische Wirkung - schützt von Innen: ;Wirkstoff wird über die Wurzel in der ganzen Pflanze verteilt;Depoteffekt: anhaltende Wirkung mindestens 2 Monate nach Gießanwendung;Sichtbarer Wirkungsbeginn nach ca. 2 Tagen

KURZTEXT:

Substral Cefalor Careo zum Gießen ist ein Konzentrat zum Schutz gegen saugende und beißende Schädlinge an Zierpflanzen wie Blattläuse, Weiße Fliege, Schild-, Woll- und Schmierläuse sowie Dickmaulrüssler.

BESCHREIBUNG:

Substral Cefalor Careo zum Gießen ist ein Konzentrat zum Schutz gegen saugende und beißende Schädlinge an Zierpflanzen wie Blattläuse, Weiße Fliege, Schild-, Woll- und Schmierläuse sowie Dickmaulrüssler. Es schützt Zimmer-, Balkon- & Terrassenpflanzen und wirkt systemisch über die Wurzel.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Anwendungszeit: Januar-Dezember Pro 1 Liter Erde: 6 ml in 100 ml Wasser dosieren und gleichmäßig die Erde damit übergießen. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. WIRKUNGSWEISE: • Gegen beißende & saugende Insekten • Systemische Wirkung - schützt von Innen: • Wirkstoff wird über die Wurzel in der ganzen Pflanze verteilt • Depoteffekt: anhaltende Wirkung mindestens 2 Monate nach Gießanwendung • Sichtbarer Wirkungsbeginn nach ca. 2 Tagen Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und -bestimmungen: Gegen beißende und saugende Insekten (ausgenommen Thrips-Arten im Freiland), Weiße Fliege und Schildlaus-Arten an Zierpflanzen im Freiland (Einzelpflanzenbehandlung) und Gewächshaus. Gegen Kartoffelkäfer an Kartoffel (Freiland), gegen Weiße Fliege und Blattläuse an Aubergine, Gemüsepaprika und Tomate (Gewächshaus) sowie gegen Blattläuse an Salat (Freiland). Zierpflanzen im Topf, Container oder Kübel* im Freiland, Gewächshaus, Zimmer, Balkone, Terrassen und Wintergärten Blattläuse, Schildlaus- Arten, Woll- und Schmierläuse, Weiße Fliege, Dickmaulrüssler | Anwendungstechnik gießen | 60ml in 1 Liter Wasser für 10 Liter Substrat | Wartezeit: ohne Bedeutung (N)** Zierpflanzen im Gewächshaus und Freiland: Saugende Insekten (Blattläuse, Zikaden, Thripse, Wanzen), Weiße Fliege, Schild-, Woll-, Schmierläuse. Beißende Insekten wie Rüssel- u. Blattkäfer, Raupen, Larven der Blattwespen, Miniermotten) | Anwendungstechnik spritzen Max 3 Anwendungen pro Kultur, bzw. je Jahr | Zierpflanzen Freiland

(Einzelpflanzenbehandlung): 5ml /500ml Wasser Pflanzengröße bis 50cm: ausreichend für 8,4m²; Pflanzengröße 50 bis 125cm: ausreichend für 5,6m² Zierpflanzen Gewächshaus: 10ml / 1 Liter Wasser Pflanzengröße bis 50cm: ausreichend für 16,7m²; Pflanzengröße 50 bis 125cm: ausreichend für 11,1m²; Pflanzengröße über 125cm: ausreichend für 8,3m² | Wartezeit: ohne Bedeutung (N)** Aubergine, Tomate, Gemüsepaprika* im Gewächshaus | Blattläuse und Weiße Fliege | Anwendungstechnik: spritzen | 5ml in 500ml Wasser für 8,3m² (Pflanzengröße bis 50cm) 10ml in 1 Liter Wasser für 11,1m² (Pflanzengröße 50 bis 125cm) 15ml in 1,5 Liter Wasser für 12,5m² (Pflanzengröße über 125cm) | Wartezeit: 3 Tage Kartoffel* im Freiland | Kartoffelkäfer | Anwendungsart: Spritzen | 5ml in 500ml Wasser/10m² | Wartezeit: 3 Tage Salate* im Freiland | Blattläuse | Anwendungsart: Spritzen | 5ml in 500ml Wasser/10m² | Wartezeit: 3 Tage *Maximal 2 Behandlungen pro Kultur bzw. je Jahr. Behandeln bis zur sichtbaren Benetzung. Bei Gemüse, Kartoffel im Abstand von 10-28 Tagen, bei Salaten 5-10 Tage. Beim Gießen in Zierpflanzen im Abstand von mind. 2 Monaten. **Für die vorgesehenen Anwendungsgebiete ist die Festsetzung einer Wartezeit ohne Bedeutung (N).

ZUSÄTZLICHER TEXT:

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung. Anwendungen nur in den in der Gebrauchsanleitung genannten Anwendungsgebieten und nur zu den hier beschriebenen Anwendungsgebieten. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/indirekte Einträge über Hof und Straßenabläufe verhindern). Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zur Höhe von 50.000 € geahndet werden. Hinweise zum Schutz der Umwelt: Das Mittel ist bis zur höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4). Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Arten *Pardosa amentata* und *palustris* (Wolfs- spinnen) sowie *Aleochara bilineata* (Kurzflügelkäfer), schwachschädigend für *Poecilus cupreus* (Laufkäfer), *Chrysoperla carnea* (Florfliege) und *Typhlodromus pyri* (Raubmilbe), schädigend für *Coccinella septempunctata* (Siebenpunkt-Marienkäfer) und *Aphidius rhopalosiphi* (Brackwespe) eingestuft. Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere. Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. Hinweise zum Schutz des Anwenders: Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig. Erste Hilfe: Nach Hautkontakt mit reichlich Wasser waschen. Nach Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Nach Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen, Arzt aufsuchen und Etikett und Verpackung vorzeigen. Zusätzliche Hinweise zur Anwendung: Cetaflor Schädlingsfrei Careo Konzentrat ist in der Regel gut pflanzenverträglich. Da bei der großen Anzahl der Pflanzenarten und -sorten unterschiedliche Verträglichkeiten auftreten können, empfiehlt es sich, besonders bei einer Spritzanwendung des gesamten Bestandes die Empfindlichkeit an einzelnen Pflanzen zu prüfen und über einen Zeitraum von ca. 10 Tagen zu beobachten. Keine Anwendung bei hohen Temperaturen (>25°C) oder direkter Sonneneinstrahlung. Hinweise zur Anwendung: Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen. Pflanzenverträglichkeit: In Abhängigkeit von Kultur, Sorte und dem Anbauverfahren können Schäden an der zu behandelnden Kultur nicht ausgeschlossen werden. Vor einem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit unter den betriebspezifischen Bedingungen zu prüfen. Lagerung und Entsorgung: Kühl, trocken, frostfrei und nur in der geschlossenen Originalpackung lagern. Leere Faltschachtel der Wertstoffsammlung beigegeben. Packungen mit eventuellen Produktresten bei Sammelstellen für Haushaltschemikalien abgeben.

PRODUKT HINWEISE:

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.

Deutschland: Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.

LOGISTISCHES:

■ **Ursprungsland:** Frankreich

STÜCK-ANGABEN:

- Stück Tiefe in mm: 57
- Stück Breite in mm: 74
- Stück Höhe in mm: 121
- Stück Bruttogewicht in Gramm: 140
- Menge Stück je VE: 12

VE-ANGABEN:

- VE EAN: 4062700966778
- VE Tiefe in mm: 358
- VE Breite in mm: 157
- VE Höhe in mm: 135
- VE Bruttogewicht in Gramm: 1970

PALETTEN-ANGABEN:

- Lagen je Palette: 12
- VE je Lage (Tiles): 16
- Menge VE pro Palette: 192
- Menge Stück pro Palette: 2304
- Gewicht Palette in kg: 380
- PAL Breite mm: 800
- PAL Tiefe mm: 1200
- PAL Höhe mm: 1770

REGULATORISCHES:

- Zolltarifnummer: 38089990
- Zulassungsnummer DE: 005686-60
- Zulassungsnummer AT: -
- Gefahrgut
- Wirkstoffe / Inhaltsstoffe: Acetamiprid
- Signalwort: Achtung
- Gefahrenhinweise: **H-Sätze:** H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise: **P-Sätze:** P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P234 Nur im Originalbehälter aufbewahren. P501 Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.
- Ergänzendes Kennzeichnungselement: keine
- Gefahrenstoff
- UN-Versandbezeichnung: Umweltgefährdender Stoff, Flüssig, N.A.G.((E)-N1-[(6-chlor-3-pyridyl) methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidin)
- ADR-Klasse: 9
- Verpackungsgruppe: III

VERPACKUNG:

- Glas: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Plastik: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Weißblech: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Transport Papier: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Papier u. Pappe: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Aluminium, andere: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Andere Materialien: Gewicht in Gramm: keine Angabe